

**UNIDAD EJECUTORA 406 RED DE SERVICIOS
DE SALUD CUSCO VRAEM**

**DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA SANITARIA
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA**

BOLETÍN
EPIDEMIOLÓGICO

SEMANA 22

Del 25 al 31 de mayo 2025



correo electrónico: epiredkp@renace.dge.gob.pe



Página web: <https://riscuscovraem.pe/vea/>



Jr.Intiraymi S/N - Kimbiri,

2025

UNIDAD EJECUTORA 406 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO VRAEM

MC. DAVID COANQUI PACORI.
Director Ejecutivo Red Cusco VRAEM.

LIC. ENF. CYNTIA FIORELA ALVAREZ NIHUA.
Directora de Inteligencia Sanitaria.

EQUIPO DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

LIC. ENF. CYNTIA FIORELA ALVAREZ NIHUA.
Responsable de la Unidad de Epidemiología.

TEC. INF. EDWIN BARRIENTOS FERNANDEZ.
Equipo Técnico.

ING. CARLOS BAUTISTA HUAMAN.
Equipo Técnico.

TEC. SEC. SHEYLA MARGOTH QUISPE RAMIREZ.
Digitadora.

BLG. NAUM YANASUPO HUICHO.
Digitador.

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA DEL 25 AL 31 DE MAYO DEL 2025

| | | |
|--------------|--|---------|
| I. | EDITORIAL | Pag. 4 |
| II. | DAÑOS DE ESTACIÓN | Pag. 5 |
| III. | MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL | Pag. 9 |
| IV. | ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | Pag. 10 |
| V. | ENFERMEDADES POR ACCIDENTES CON ANIMALES PONZOÑOSOS. | Pag. 15 |
| VI. | OTROS BROTES Y EVISAP | Pag. 16 |
| VII. | ENFERMEDADES INFECCIOSAS NO TRANSMITIDAS POR VECTORES. | Pag. 17 |
| VIII. | INDICADORES DE NOTIFICACIÓN EPIDEMIOLÓGICA | Pag. 21 |
| IX. | AGRADECIMIENTOS. | |

I. EDITORIAL

La OMS pide medidas urgentes para prohibir los productos de tabaco y nicotina con saborizantes.



Ginebra, 30 de mayo de 2025 – En el Día Mundial Sin Tabaco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha presentado una nueva publicación y hace un llamado a los gobiernos para que prohíban urgentemente todos los sabores en productos de tabaco y nicotina, incluidos los cigarrillos, bolsitas de nicotina, pipas de agua (hookahs) y cigarrillos electrónicos, con el fin de proteger a la juventud de la adicción y las enfermedades.

Sabores como el mentol, chicle o algodón de azúcar enmascaran la dureza de los productos de tabaco y nicotina, convirtiendo productos

tóxicos en anzuelos atractivos para los jóvenes. Los saborizantes no solo dificultan dejar de fumar, sino que también se han relacionado con enfermedades pulmonares graves. Los cigarrillos, que siguen matando hasta a la mitad de sus consumidores, también se comercializan con sabores añadidos.

“Los saborizantes están alimentando una nueva ola de adicción y deben prohibirse”, afirmó el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “Socavan décadas de avances en el control del tabaco. Sin una acción decidida, la epidemia mundial de tabaco, que ya causa alrededor de 8 millones de muertes cada año, continuará siendo impulsada por la adicción disfrazada con sabores atractivos”.

La publicación Los accesorios con saborizantes en productos de tabaco potencian su atractivo revela cómo los sabores y accesorios, como filtros con cápsulas o gotas aromatizantes, se comercializan para eludir regulaciones y captar nuevos usuarios.

Los sabores son una de las principales razones por las que los jóvenes prueban productos de tabaco y nicotina. Junto con los envases llamativos y las estrategias de mercadeo impulsadas por redes sociales, han incrementado el atractivo de las bolsitas de nicotina, el tabaco calentado y los vaporizadores desechables, que se han convertido en productos adictivos y nocivos dirigidos agresivamente a los jóvenes.

“Estamos viendo cómo una generación se engancha a la nicotina a través de bolsitas con sabor a osito de goma y vaporizadores de colores brillantes”, dijo el doctor Rüdiger Krech, Director de Promoción de la Salud de la OMS. “Esto no es innovación, es manipulación. Y debemos detenerlo”.

La OMS reitera que los productos de tabaco, incluidos los productos de tabaco calentado, exponen a los consumidores a sustancias químicas cancerígenas y deben estar estrictamente regulados.

Situación en las Américas

Según datos recientes, la Región de las Américas presenta la segunda mayor prevalencia de consumo actual de tabaco entre adolescentes de 13 a 15 años, con un 11,9% en niños y un 10,7% en niñas. Además, es la región con la menor diferencia entre géneros, lo que indica una equiparación preocupante en los patrones de consumo. Paralelamente, se ha observado un aumento en el uso de cigarrillos electrónicos, especialmente entre adolescentes y jóvenes. En este grupo etario, el promedio regional de consumo de estos productos es del 5,4%, una cifra alarmantemente cercana al promedio de consumo de cigarrillos convencionales, que alcanza el 6%.


Frente a esta situación, los países de las Américas han avanzado en la implementación de medidas eficaces para reducir el consumo de tabaco y contrarrestar las estrategias de la industria tabacalera. Diez Estados Miembros han adoptado prohibiciones totales de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, algunas de las cuales incluyen productos emergentes como los cigarrillos electrónicos; mientras que siete países han prohibido completamente la comercialización de estos últimos.

Fuente: <https://www.paho.org/es/noticias/notas-prensa>.

II. DAÑOS DE ESTACIÓN


SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CASOS DE IRA EN MENORES DE 5 AÑOS.

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA no Neumonía)



La incidencia de IRAS a la S.E. N° 22-2025; se notificaron 191 episodios de IRA no neumonías, cuya incidencia acumulada (IA) es de 418.08 x 10,000 menores de 5 años, en el 2022, se notificó un mayor número de iras (promedio de 6,924 episodios).


figura 2. Tendencia de IRA no Neumonía <5 años RSSCUSCO VRAEM. 2023-2025




La Tendencia de casos de IRA no neumonías en niños menores de 5 años. Las IRAS presentaron un incremento en la S.E. N° 02 y 03 -2025; El incremento exponencial de casos coincide con el inicio de temporada de bajas temperaturas, debido a los cambios climatológicos a lo largo durante el año 2025.

Neumonía en niños menores de 5 años.

Figura 3. Incidencia acumulada de Neumonías en <5 años RSSCVRAEM, 2020 - 2025



La incidencia acumulada de neumonías en menores de 5 años. Hasta la S.E. N° 22 - 2025, se reportaron 68 episodios de neumonías en menores de 5 años, con una I.A. de 8.37 de episodios de neumonía por cada 10,000 menores de 5 años, notificado por el IPRESS de HSKJ y PICHARI.




La incidencia acumulada de neumonías en menores de 5 años. Hasta la S.E. N° 22 - 2025, se reportaron 68 episodios de neumonías en menores de 5 años, con una I.A. de 10.04 de episodios de neumonía por cada 10,000 menores de 5 años, notificado por el IPRESS de HSJK y PICHARI.

El canal endémico de neumonías en menores de 5 años, muestra el incremento desde la S.E. 29-2024 con 12 casos notificados,

encontrándose por encima de la zona de alarma. Este número de episodios coincide con la temporada de bajas temperaturas sin embargo se debe tomar medidas y seguir considerando las siguientes recomendaciones:

- Fortalecer las medidas de prevención primaria como la vacunación oportuna, el lavado de manos en las madres y en los niños, evitar lugares conglomerados y el uso de mascarillas en ambientes cerrados, en caso de que la madre esta con síntomas respiratorios para prevenir el contagio del menor.
- Fortalecer las competencias del personal de salud para el diagnóstico y manejo oportuno de los episodios de neumonías, priorizando a los menores de un año.
- Monitorizar el sistema referencias y contra- referencias, a fin de identificar las deficiencias para garantizar una respuesta oportuna.
- Implementar de acuerdo al nivel de complejidad de la IPRESS con insumos, medicamentos y recurso humano capacitado, para garantizar una adecuada atención.


SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDA).



Las enfermedades diarreicas agudas (EDA) constituyen un problema de salud pública a nivel mundial, afectando a todos los grupos etarios.

Los episodios de EDA Acuosa en comparación de anteriores años se evidencia un incremento de episodios teniendo un pico en la S.E. N°38 -2024 el cual hasta el momento estuvo disminuyendo paulatinamente hasta la actualidad.


Figura 6. Canal endémico de EDAs acuosas en > 5 años RSCVRAEM, 2025



El total de EDAs acuosa en **mayores de 5 años** en la Red Cusco VRAEM durante la S.E. N°22 - 2025 se notificó 13 episodios, total acumula de 582 episodios de EDAs. A diferencia del año 2024 se aumento con 5% de episodios.

Estas cifras nos colocan por encima de la zona de alarma, no obstante, se debe tomar medidas para su control, para llegar a una zona de éxito.

Figura 7. Canal endémico de EDAs acuosas en < 5 años RSCVRAEM, 2025



En el Canal endémico para episodios de EDA en niños **menores de 5 años** durante la S.E. N° 22 - 2025 se notificó 20 episodios, reflejado en el canal endémico, se encuentra en Zona de Alarma.

Tabla 1. Cuadro comparativo de EDAs acuosas en <5 años por Distrito, RSCVRAEM 2024* - 2025*

| DISTRITOS | 2024 | | 2025 | |
|----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| | CASOS | TA x 10000 | CASOS | TA x 10000 |
| CIELO PUNCO | 47 | 21.52 | 33 | 15.77 |
| KIMBIRI | 285 | 19.60 | 113 | 8.04 |
| MANITEA | 106 | 29.91 | 40 | 11.70 |
| PICHARI | 431 | 18.63 | 190 | 8.56 |
| UNION ASHANINKA | 134 | 18.29 | 29 | 4.03 |
| VILLA KINTIARINA | 142 | 47.78 | 27 | 9.08 |
| VILLA VIRGEN | 75 | 40.17 | 21 | 11.65 |
| Total general | 1220 | 21.95 | 453 | 8.15 |

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica RSCVRAEM.

La diferencia porcentual de incremento o disminución del total de episodios de EDA en niños menores de 5 años a nivel distrital en comparación con el año 2024 y el 2025.

Se muestra en la tabla N° 01 las cantidades notificadas por distritos, 33 Cielo Punco, 113 Kimbiri, 40 Manitea, 190 Pichari, 29 Unión Ashaninka, 27 Villa Kintiarina y 21 en Villa Virgen.

Hasta la S.E. N° 22 -2025. Se notificaron 582 episodios de EDA, cuya incidencia es de 108.19 casos por 10,000 habitantes. La I.A. En el 2019 se mantiene por encima de 283 casos x 10000 hab. Excepto los años pandémicos donde se aprecia una caída del 50% en el año 2020 y desde entonces existe un incremento constante hasta la fecha con una incidencia de 9.00 casos de EDA por cada 10 000 habitantes.

Figura 8. Incidencia acumulada de EDAs en >5 años RSSCVRAEM, 2019 – 2025*





Figura 9. Tasa de incidencia de EDAs en <5 años por Distrito RSCVRAEM 2025*



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica RSCVRAEM

Las mayores tasas de Incidencia de casos de EDA en niños menores de 5 años a la S.E. N° 22 -2025 se encuentran en el cielo punco con 25.81 x 1,000 menores de 5 años. Por tanto, el distrito se constituye como la jurisdicción de mayor preventivo promocionales, donde se comprometa a realizar un trabajo conjunto entre el sector salud y la comunidad con el fin de prevenir el incremento de EDAs.

III. MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA MUERTE MATERNA

En el presente SE. N°22 – 2025 no se reportó casos de Muerte Materna. En la S.E. N°14-2025 se reportó una muerte materna en una gestante de 31 años de edad procedente del Distrito de Unión Ashaninka, que falleció en trayecto al Hospital Regional Ayacucho el 01-03-2025, siendo su clasificación **MM indirecta**.

Figura 10. Muertes maternas por distritos RSSCVRAEM, 2016 – 2025* (hasta la S.E. N° 15).





Figura 11. Muertes maternas según tipo de causa RSSCVRAEM, 2016 – 2025* (hasta la S.E. N° 15).



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica RSSCVRAEM.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA MUERTE PERINATAL

Tabla 2. Número de muertes perinatales por Distritos RSSCVRAEM, 2023 – 2025.

| DISTRITO | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|------------------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|
| | FETAL | NEONATAL | TOTAL | FETAL | NEONATAL | TOTAL | FETAL | NEONATAL | TOTAL |
| PICHARI | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| KIMBIRI | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| VILLA KINTIARINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA VIRGEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANITEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CIELO PUNCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION ASHANINKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIO TAMBO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 7 | 5 | 12 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 6 |

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica RSSCVRAEM.

Durante la S.E. N°22 – 2025, no se reporta caso de muerte perinatal/neonatales, hasta la SE. 22 se tiene 06 caso acumulado perteneciente del Distrito de Kimbiri, Manitea y Pichari. Durante el 2024 se notificaron 11 defunciones perinatales con 6 casos fetales y 5 neonatales, las que más casos registran en la semana 32-2024. Por otro lado, hasta la S.E. N°52-2023 se notificaron 12 defunciones perinatales siendo los distritos más afectados Kimbiri y Pichari.

En el 2024, el 50,0% (6/6) de las muertes fetales y el 50.0% (5/5) de las muertes neonatales ocurrieron en la comunidad (tabla 3), lo que inicialmente podría significar que el trabajo de seguimiento

prenatal en la comunidad debe ser reforzado, con énfasis en el reconocimiento oportuno de los signos de alarma en la gestante (sangrado, ausencia o disminución de movimientos fetales, entre otros). Así mismo la atención de las últimas semanas de gestación debe mejorar para disminuir el 50% (2/2) de muertes neonatales en el EESS.

Tabla 4. Matriz Babies para defunciones perinatales RESSCVRAEM, 2025*

| PESO/ DENOMINACION | ÓBITO FETAL | | NEONATAL | | TIEMPO DE VIDA DEL RN | | | TOTAL |
|-----------------------|--|-------------|-------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------|----------|
| | ANTE PARTO | INTRA PARTO | POST PARTO | TOTAL | <24 HR | 1-7 DIAS | 8-28 DIAS | |
| MBPN (500-1499 gr.) | 3 | | | 3 | 3 | | | 3 |
| BPN (1500-2499 gr.) | | | | | | | | |
| PN(>2500 gr.) | | | 3 | 3 | 3 | | | 3 |
| NA | | | | | | | | |
| TOTAL | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | | | 6 |
| PESO/ DENOMINACION | CAUSA DE MORTALIDAD PERINATAL-NEONATAL | | | | | | | TOTAL |
| | P/N | ASFIXIA | SD. DISTRES | MALFORMACION | INFECCION | MUERTE SUBITA | OTROS | |
| MBPN (500-1499 gr.) | 3 | | | 2 | | | 1 | 3 |
| BPN (1500-2499 gr.) | | | | | | | | |
| PN(>2500 gr.) | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | 3 |
| NA | | | | | | | | |
| TOTAL | 6 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | 6 |

SEM. N° 20

Un caso fetal notificado por el Hospital San Juan de Kimbiri VRAEM

IV. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE MALARIA

**Tabla 5. Incidencia Acumulada de Malaria por distrito
RED CUSCO VRAEM 2021 – 2025***

| PROVINCIAS | DISTRITOS | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|----------------------------|------------------|-----------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-----------|------------------|
| | | CASOS | I.A X 1,000 HAB. | CASOS | I.A X 1,000 HAB. | CASOS | I.A X 1,000 HAB. | CASOS | I.A X 1,000 HAB. | CASOS | I.A X 1,000 HAB. |
| LA CONVENCION | CIELO PUNCO | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.46 | 0 | - | 0 | - |
| LA CONVENCION | KIMBIRI | 4 | 0.38 | 2 | 0.12 | 16 | 1.15 | 0 | - | 2 | 0.14 |
| LA CONVENCION | PICHARI | 76 | 4.09 | 50 | 2.21 | 42 | 1.88 | 143 | 6.18 | 2 | 0.09 |
| LA CONVENCION | UNION ASHANINKA | 0 | - | 127 | 14.15 | 186 | 27.80 | 15 | 2.05 | 10 | 1.36 |
| LA CONVENCION | VILLA KINTIARINA | 1 | 0.68 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Total LA CONVENCION | | 81 | 1.89 | 179 | 3.06 | 245 | 4.62 | 158 | 2.84 | 14 | 0.25 |

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica RSSCVRAEM.

<1 BAJO RIESGO



10.01-50 ALTO RIESGO



1-10 MEDIANO RIESGO



>50.01 MUY ALTO RIESGO




Durante la S.E. N° 22 - 2025, no se reporta caso de malaria por Plasmodium vivax, Hasta la SE.22 se reportó 14 casos de malaria. En el año 2024 se reportaron 158 casos de malaria que corresponden a la cuenca del VRAEM de la provincia La Convención, siendo el distrito de Pichari el que se encuentra en una estratificación de mediano riesgo con 6 casos x 1,000 seguido por Unión Ashaninka con 2.5 casos x 1,000 hab.

Tabla 6. Incidencia Acumulada de Malaria por grupo etario RSSCVRAEM 2025*

| Etapa de vida | N° Casos | TIA x 10000 Hab. |
|---------------|----------|------------------|
| Niño | 6 | 1.08 |
| Adolescente | 3 | 0.54 |
| Joven | 2 | 0.36 |
| Adulto | 3 | 0.54 |
| Adulto mayor | 0 | 0.00 |

El grupo etario de mayor riesgo para malaria durante el año 2025 corresponde a población niño con una tasa de incidencia acumulada de 1.08 casos x 1000 hab. Seguido por la población Adolescente con 03 casos x 1000 hab. En cuanto a la distribución por sexo, el 62% de los casos corresponden a población masculina y el 38% a población femenina.

Figura 10. Canal Endémico y riesgo de Malaria RSSCVRAEM 2025*



De acuerdo al canal endémico se tiene 14 casos hasta la SE N° 22 – 2025, y el año 2024 los casos de malaria superaron la tendencia esperada durante el primer semestre del año, con brotes en las localidades de Natividad y Oserhuato del distrito de Pichari, los casos se encuentran por encima de la zona de seguridad.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DENGUE.

A nivel de la Red Cusco VRAEM los primeros casos de dengue autóctonos se reportaron desde el año 2015, en el Distrito de Kimbiri y Pichari, Provincia La Convención; en el mismo año del 2015 se registra los primeros brotes de dengue, el año 2022 reporta el mayor número de casos con un incremento acelerado de nuevos escenarios de transmisión.


Tabla 7. Casos y proporción de casos de Dengue por Distrito RSSCVRAEM, 2016 - 2025*

| DISTRITOS | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
|-------------------|------------|------------|----------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | | Confirmado | Probable | % |
| KIMBIRI | 119 | 78 | 3 | 4 | 232 | 454 | 549 | 292 | 36 | 42 | 9 | 18.3% |
| PICHARI | 702 | 232 | 0 | 4 | 1142 | 378 | 433 | 467 | 239 | 150 | 5 | 65.2% |
| VILLA VIRGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 107 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0.4% |
| MANITEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| CIELO PUNCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0.4% |
| VILLA KINTIARINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| UNION ASHANINKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 63 | 43 | 36 | 0 | 15.7% |
| RSSCVRAEM | 821 | 311 | 3 | 8 | 1374 | 882 | 1219 | 1059 | 322 | 230 | 15 | 100% |
| T.I.Ax10,000 hab. | 19.83 | 7.53 | 0.72 | 2.03 | 340.84 | 205.93 | 208.27 | 199.71 | 57.94 | 41.39 | | |
| Defunciones | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | |

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica RSSCVRAEM.

Durante S.E. N° 22 - 2025, se reportan 3 casos confirmados de dengue, procedentes del distrito de Pichari, se tiene **230 casos confirmados, 15 casos probables, 817 descartados y 0 defunciones.**

**Figura 11. Incidencia Acumulada de dengue por Distrito
RSSCVRAEM 2025***




Durante el año 2025, los distritos con mayor Tasa de Incidencia por dengue son Pichari y kimbiri, que se encuentran por encima de la Tasa de Incidencia Acumulada (12.04 % x 1,000 hab.), y reportan brote durante el primer trimestre del año.

Los factores de riesgo que favorecen la presencia de la enfermedad, es la adaptabilidad del vector a nuevos escenarios y el incremento de la urbanización poco ordenada, así como el incremento de criaderos en material útil, lo que requiere de estrategias innovadoras de educación sanitaria y comunicación efectiva para generar participación activa de la

población en la prevención del dengue.

**Figura 12. Canal Endémico y riesgo de Dengue
RSSCVRAEM 2025***



Durante la S.E. 22 - 2025, el canal endémico muestra que el comportamiento del dengue se encuentra en zona de éxito. A diferencia del año 2022 con 1219 casos, se tuvo un descenso en el año 2024 con 320 casos. Para el presente año 2025 se evidencia una tendencia a incremento desde la primera, tercera semana, la población más afectada se encuentra el Distrito de Pichari.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica RSSCVRAEM.

Tabla 7. Incidencia Acumulada de dengue por grupo etario RSSCVRAEM, 2025.

| Etapa de vida | N° Casos | TIA x 10,000 Hab. |
|---------------|----------|-------------------|
| Niño | 39 | 7.25 |
| Adolescente | 29 | 5.39 |
| Joven | 59 | 10.97 |
| Adulto | 95 | 17.66 |
| Adulto mayor | 8 | 1.49 |

Hasta la S.E. 22 – 2025, la población con mayor riesgo para dengue es la población adulta con una T.I.A. de 17.66 por 10,000 hab., seguido por la población joven con una T.I.A de 10.97 casos x 10,000 hab.

En cuanto a la distribución por sexo, el 53.0% de los casos corresponden a población femenina y el 47.00% a población masculina.

Respecto a la condición clínica, En el año 2025, el 94% de los casos corresponde a dengue sin señales de alarma, el 6% a dengue con señales de alarma y 0% a dengue grave.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE OROPUCHE.

Los primeros casos del virus Oropuche a nivel de la Red Cusco VRAEM, se reportaron en el año 2022, en el Distrito Villa Kintiarina y Unión Ashaninka, en el año 2024 se tuvo más incremento del virus Oropuche con 16 casos reportados.


Tabla 8. Incidencia Acumulada de Oropuche por Distrito RSSCVRAEM, 2025.

| DISTRITOS | 2022 | 2024 | 2025 | |
|----------------------|----------|-----------|------------|-----------------|
| | | | Confirmado | TIAx10,000 hab. |
| VILLA KINTIARINA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UNION ASHANINKA | 1 | 0 | 1 | 1.39 |
| CIELO PUNCO | 0 | 0 | 1 | 4.78 |
| KIMBIRI | 0 | 11 | 7 | 4.98 |
| VILLA VIRGEN | 0 | 1 | 7 | 38.82 |
| MANITEA | 0 | 0 | 1 | 2.93 |
| PICHARI | 0 | 4 | 4 | 1.80 |
| Total general | 2 | 16 | 21 | 3.90 |

Hasta la S.E. 22 – 2025, se tiene 21 casos de oropuche acumulados con una tasa de incidencia de 3.90 por 10,000hab.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LEISHMANIOSIS.

Figura 13. Casos de Leishmaniasis por tipo de lesión RSSCVRAEM 2020 - 2025*



Fuente: Sistema de vigilancia Epidemiológico-RSSCVRAEM.

Durante la S.E. N° 22 - 2025, no se reporta casos de leishmaniasis, hasta la S.E. 22 se tiene 05 casos acumulados. En el Año 2024 se reportó un total de 10 casos de leishmaniasis, haciendo una T.I.A. de 1.80 x 10,000 hab.

El 100% corresponde a Leishmaniasis cutánea y el 0% a L. mucocutánea.

El 70% de la población afectada es masculina y el 30% es femenina, el grupo etario más afectado es de 18 a 29 años.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA LEPTOSPIROSIS.

Tabla 9. Casos de Leptospirosis por Distritos
RSSCVRAEM, 2020 - 2025*

| DISTRITOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| KIMBIRI | 1 | 27 | 10 | 12 | 40 | 6 |
| PICHARI | 0 | 17 | 2 | 4 | 30 | 7 |
| VILLA VIRGEN | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| MANITEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| UNION ASHANINKA | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 |
| CIELO PUNCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| VILLA KINTIARINA | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Total general | 1 | 44 | 27 | 26 | 93 | 18 |

A nivel de la Red Cusco VRAEM, hasta la S.E. N° 22 - 2025, se reportó 18 casos de leptospirosis.

Durante el año 2024 se tiene notificado 93 casos confirmados procedentes de los Distritos de Pichari (30%), Kimbiri (40%), Villa Virgen (10%), Manitea (09%), Union Ashaninka (3%) y Cielo Punco (1%) haciendo una T.I.A. de 15.66 x 10,000 hab.

La población con mayor riesgo es el distrito de Kimbiri con una T.I.A. de 26.88 x 10,000hab.

Figura 14. Incidencia acumulada de Leptospirosis
RSSCVRAEM, 2020 - 2025*






Figura 15. Distribución según sexo y edad
Red Cusco VRAEM, 2020 - 2025*



Fuente: Sistema de vigilancia Epidemiológico-RSSCVRAEM
Fuente: Sistema de vigilancia Epidemiológico-RSSCVRAEM

La población más afectada durante el año 2024 es la femenina con un 91 %, el grupo de edad que reporta el mayor número de casos se encuentra entre 20 y 29 años.

Figura 16. Número de casos por distrito,
RSSCVRAEM 2024-2025*



A nivel de la Red Cusco, 7 distritos presentan casos de leptospirosis, siendo los distritos que reportan más del 80% de los casos Pichari, Kimbiri y Villa Virgen que corresponden a la provincia La Convención.

Fuente: Sistema de vigilancia Epidemiológico-RSSCVRAEM


SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL TUBERCULOSIS EN LA REGIÓN CUSCO.

Figura 17. Incidencia acumulada de TBC x 1000 hab. RSCVRAEM, 2020 - 2025*

En el último reporte de la OPS, Perú es uno de los países con mayor cantidad de casos de Tuberculosis (TBC) ocupando el segundo lugar en las Américas, y según la CDC en el Perú anualmente se notifican alrededor de 27 000 casos nuevos.


Durante la SE.22- 2025, no se reporta casos, hasta la SE. 20 se tiene 10 caso de TBC Acumulados, con una I.A. 1.80 x

10,000 hab., Para el año 2024 se reportaron 35 casos de TBC, que corresponde a una I.A. 6.30 x cada 10,000 hab. La incidencia anual de los últimos 3 años muestra una disminución de TBC con 7.02 a 7.38 x cada 10,000 hab.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica-RSCVRAEM

Figura 18. Defunción acumulada de TBC x 10000 hab. RSCVRAEM 2024 - 2025*




Durante la S.E. 22 - 2025 no se reportó casos de defunción a diferencia del año 2024 se tiene 7 casos de defunción por TBC, 01 pertenece al 2023, con 43% en el Distrito de Pichari, 29% Quisto Central y 14% en Mantaro y 14% en Mapitunari.

V. ENFERMEDADES POR ACCIDENTES CON ANIMALES PONZOÑOSOS

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE OFIDISMO.


Figura 19. Incidencia acumulada de Ofidismo RSCVRAEM, 2018-2025



Fuente: Sistema de Vigilancia RSCVRAEM

En el SE. 22 - 2025, no se reporta accidente por mordedura de serpiente. Durante el año 2024 se reportaron 18 casos confirmados, con una T.I.A. de 3.24 x 10,000 hab. La tasa de letalidad se mantiene en 0%.


Procedentes del Distrito de Pichari (12), Manitea (2), y Unión Ashaninka (4) haciendo el total de casos, con un T.I.A. de 3.24 x 10,000 hab. Cabe precisar que a la fecha no se cuenta con casos probables ni descartados,



Los distritos con mayor notificación de ofidismo es Pichari con una T.I.A DE 2.16 x 10,000 hab. Seguida por el Distrito de Unión Ashaninka con 4 casos de ofidismo.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LOXOSCELISMO


Figura 21. Incidencia acumulada de loxocelismo RSCVRAEM, 2019-2025



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica RSCVRAEM

Hasta la S.E. N° 22 – 2025, no se reporta casos de accidentes por mordedura de araña. Durante el año 2024 se ha notificado 77 casos de loxocelismo siendo con mayor riesgo el Distrito de Pichari con 49 casos, Manitea con 14, Kimbiri 7 y Unión Ashaninka 7 haciendo total de casos con T.I.A DE 13.86 x10,000 hab.

Durante el año 2025, los distritos con mayor casos notificados son: 17 Pichari, 7 Manitea, 01 kimbiri y 6 Union Ashaninka, total de 32 casos acumulados.



Fuente: Sistema de vigilancia Epidemiológico-RSCVRAEM

VI. OTROS BROTES Y EVISAP

ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS.

Durante la S.E. N° 22-2025 no se reporta brote de ETA. Durante el año 2024 se tiene 01 brote de ETA notificado al sistema de vigilancia epidemiológica, los cuales fueron controlados de manera satisfactoria.

Tabla N° 10. Casos de enfermedades transmitida por alimentos notificados RSSCVRAEM 2024.*

| N° | S.E. | Distrito | Provincia | Descripción | Agente | Tasa de Ataque |
|----|------|----------|---------------|--|------------|----------------|
| 1 | 14 | Manitea | La Convención | Intoxicación accidental, con 19 agricultores afectados por consumo de bebida contaminada, en la localidad de Lobo Tahuantinsuyo. | Plaguicida | 100% |

VARICELA.

Durante la S.E. N° 22-2025 no se notifica brote de varicela. Durante el año 2024 se tiene el reporte de 01 brote de varicela sin complicaciones, los grupos de edad afectados se encuentra entre 5ª 9 años.


Tabla N° 11. Brote de Varicela a nivel de la RSSCVRAEM 2024.*

| S.E. | Provincia | Distrito | Descripción | Tasa de ataque | N° casos | Estado |
|------|---------------|----------|------------------|----------------|----------|------------|
| 38 | La Convención | Pichari | I.E. La Victoria | 25% | 24 | Controlado |

VII. ENFERMEDADES INFECCIOSAS NO TRANSMITIDAS POR VECTORES.

SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA DE HEPATITIS B.

Figura 24. incidencia acumulada de Hepatitis B, RSSCVRAEM, 2019-2025



Fuentes: Sistema de Vigilancia Epidemiológico RSSCVRAEM

Durante la S.E. N° 22 - 2025, no se reporta casos de hepatitis que corresponde a semanas anteriores. Hasta la SE. 19 se tiene un acumulado de 18 casos de hepatitis b con una T.I. 3.24 x 10,000 hab., la T.I. de Hepatitis B del periodo 2019 al 2022, a nivel del distrito muestra una tendencia descendiente en general, pese a que en el 2023 y 2024 se notificaron

la misma cantidad de casos, el año 2024 se tuvo una incidencia de 12.60 lo cual significa que existe riesgo a contraer la enfermedad.

Durante el año 2025 la población más afectada pertenece al sexo femenino con 10 casos con una T.I. 1.80 x 10,000 hab.




Tabla 12, Incidencia acumulada de Hepatitis B, por Distritos RSSCVRAEM, 2020 – 2025*.

| DISTRITOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| PICHARI | 0.99 | 1.35 | 0.57 | 1.25 | 1.82 | 0.52 |
| KIMBIRI | 1.58 | 2.08 | 0.52 | 1.65 | 1.03 | 0.21 |
| VILLA KINTIARINA | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 2.26 | 1.13 | 0.00 |
| MANITEA | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.75 | 0.55 | 0.00 |
| CIELO PUNCO | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 1.61 | 1.61 |
| VILLA VIRGEN | 0.50 | 1.44 | 1.88 | 1.82 | 0.92 | 0.00 |
| UNION ASHANINKA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.34 | 0.34 |
| Total general | 8.43 | 11.67 | 5.47 | 13.20 | 12.78 | 3.42 |


Fuente: Sistema de vigilancia Epidemiológico-RSSCVRAEM.

La importancia de la Hepatitis viral es que la mayoría cursa en forma silenciosa y muchas personas las pueden tener o las tuvieron sin darse cuenta; además, pueden producir cirrosis, cáncer hepático, necesidad de transplante y elevada mortalidad. A pesar de esta situación se pueden prevenir,

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA SIFILIS CONGÉNITA Y MATERNA

SÍFILIS CONGÉNITA

Figura 26. Incidencia acumulada de Sífilis Congénita RSSCVRAEM, 2019 - 2025*



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica RSSCVRAEM

Es una enfermedad que debe considerarse como un problema del binomio madre-hijo; la infección del feto se produce a través de la placenta de la madre con sífilis, en periodos tempranos del embarazo, aunque los cambios anatómicos no se observan hasta que madura el sistema inmunológico del niño, algo que suele ocurrir al quinto mes. La probabilidad de que una mujer embarazada no tratada, durante el primer año de su

enfermedad, transmite al feto la sífilis es cercana al 90%.

En caso de que el feto se hubiera infectado durante los primeros meses del embarazo, la probabilidad de muerte en útero se incrementa considerablemente.

Durante la S.E. N° 22 – 2025 no se reporta casos de sífilis congénita, no obstante, la incidencia acumulada en los últimos cinco años muestra un descenso teniendo el 2019 una I.A. de 0.24 por 10 000 hab.

Tabla 13. Casos de Sífilis congénita, por Distrito RSCVRAEM 2019 – 2025*


| DISTRITOS | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| KIMBIRI | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| PICHARI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VILLA VIRGEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total general | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |

Fuente: Sistema de vigilancia Epidemiológico-RSCVRAEM.

Se consignan el número de casos según el distrito, desde el año 2019 se mantiene con 01 caso en el distrito de pichari, el año 2024 se notificaron 2 casos de sífilis congénita con una T.I. 0.34 x 10,000 hab.

SÍFILIS MATERNA

Figura 27. Incidencia Acumulada de Sífilis Materna RSCVRAEM, 2018 - 2025*



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica RSCVRAEM

Es aquella que se diagnostica durante la gestación, el postaborto o el puerperio inmediato y puede encontrarse en cualquiera de sus fases, aunque es mucho más frecuente en la fase secundaria indeterminada.

Durante la gestación adquiere una mayor importancia, debido al riesgo de infección transplacentaria al feto, la cual

puede tener resultados adversos severos, incluyendo muerte perinatal, parto prematuro, bajo peso al nacer, anomalías congénitas y sífilis activa en el neonato, complicaciones que podrían ser totalmente prevenibles con el tratamiento de fácil acceso y de bajo costo que es la penicilina; es decir la detección precoz de la sífilis en la mujer embarazada y/o de su pareja y el adecuado y oportuno tratamiento son estrategias fundamentales para la prevención de la sífilis congénita. La mayoría de los casos proceden de 2 provincias: la Convención y Cusco.

Durante la S.E. N° 22 – 2025, no se reporta caso de sífilis materna, hasta la S.E. 22 se tiene acumulado de 02 casos. En el año 2021 y 2022 se evidencia un incremento con una T.I. 15.36 y para el 2023 y 2024 tuvo un ligero descenso en la I.A. de 3.60 por 10,000 hab. En comparación al año 2020 que tuvo una I.A. de 3.22 por 10,000 hab.

**Tabla 14. Incidencia Acumulada de Sífilis Materna por Distrito
RSSCVRAEM 2019 - 2024***

| DISTRITOS | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PICHARI | 4.75 | 2.32 | 12.92 | 9.72 | 5.37 | 5.19 |
| KIMBIRI | 6.04 | 8.88 | 12.30 | 5.82 | 3.59 | 2.06 |
| UNION ASHANINKA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.32 | 8.11 | 10.09 |
| VILLA KINTIARINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 1.49 | 2.73 |
| VILLA VIRGEN | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 5.39 | 0.00 | 0.00 |
| MANITEA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 2.83 | 0.00 |
| Total general | 3.55 | 3.22 | 8.87 | 6.49 | 3.96 | 3.60 |

FUENTE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica – RSSCVRAEM.


SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL VIH EN LA RSSCVRAEM

Debemos difundir el: **“INFORMATE, USA PRESERVATIVO, HAZTE LA PRUEBA Y NO DISCRIMINES ES ABSURDO”**.

Hasta la S.E. 22 - 2025, se tiene 10 casos de VIH. Para el año 2024 se reportan 16 casos de VIH, con una I.A. 13.57 x 10,000 hab.

Según la OPS el Perú ha logrado contener la propagación del VIH en la población general. En la última década, la razón de masculinidad se ha mantenido, estable en el orden de 2,7 a 3,0. Sin embargo, se alerta sobre un incremento de la incidencia de casos en la población más joven de HSH (hombre que tiene sexo con hombre), la elevadísima prevalencia que afecta a la población transgénero (especialmente aquella dedicada al trabajo sexual) y a las trabajadoras sexuales que no acceden al sistema de salud. En el departamento de Cusco muestra que el sexo masculino es el que presenta una mayor cantidad de casos de VIH teniéndose 12 casos de varones versus 5 de mujeres hasta la SE. 52.

**Figura 28. N° de casos de VIH por años
RSSCVRAEM, 2020 - *2025.**



Fuente: Sistema de Vigilancia RSSCVRAEM

**Tabla 15. Número de casos de VIH por sexo
RSSCVRAEM 2022 – 2025***

| AÑO | VARON | MUJER | TOTAL |
|------|-------|-------|-------|
| 2022 | 13 | 1 | 14 |
| 2023 | 13 | 3 | 16 |
| 2024 | 12 | 5 | 17 |
| 2025 | 7 | 3 | 10 |

**Tabla 16. Número de casos de VIH por grupo etario
RSSCVRAEM 2022 – 2025***

| EDAD | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|------|------|------|------|
| 0 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - 17. | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 - 29 | 13 | 9 | 14 | 1 |
| 30 - 59 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| 60 -100 | 0 | 1 | 0 | 3 |

La concentración de casos de VIH reportados en el Perú se encuentra en el grupo etario de 18 a 29 años de edad, según datos de la Dirección General de Epidemiología, lo que significa que estas personas se infectaron cuando tenían entre 18 y 29 años de edad, en el departamento de Cusco. El año 2024 se tuvieron 17 casos siendo el grupo etario más afectado que oscila entre los 18 a 29 años reportándose 17 casos.

Tabla 17. I.A. de VIH x 10 000 hab. por Distrito 2022 – 2025*

| DISTRITOS | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|------|-------|------|------|
| PICHARI | 2.65 | 4.47 | 5.19 | 6 |
| KIMBIRI | 1.75 | 0.00 | 1.38 | 3 |
| MANITEA | 0.00 | 11.31 | 5.64 | 0 |
| UNION ASHANINKA | 2.23 | 0.00 | 1.36 | 1 |
| ECHARATE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CANAYRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RIO TAMBO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RIO SANTIAGO | 2 | 0 | 0 | 0 |

Respecto al Distrito con mayor I.A. de VIH es el distrito de Pichari con 5.19 x 1,000 habitantes 16 de ellos tiene VIH.

FUENTE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica – RSSCVRAEM.

X. INDICADORES SEMANALES DE NOTIFICACION DE DAÑOS REGULARES, (EDA, IRA, CONSOLIDADO INDIVIDUAL)

Figura 29. Promedio ponderado de notificación según EESS. Red Cusco VRAEM – 2025*





Figura 30. Promedio ponderado de notificación según EESS. -2025*



Durante la S.E. N° 22 - 2025, los indicadores de Notificación en Vigilancia Epidemiológica de la Red Cusco VREAEM, muestran que el promedio ponderado de calificación es de 98.7%, en relación a la semana anterior.

La oportunidad se encuentra en 95.65%, cifra que bajo 0.1% en relación a la semana anterior, en cuanto **la cobertura** se alcanzó un 100% cifra que se mantiene en relación a la semana anterior; respecto a **la calidad** del dato se encuentra en 96.96% que subió 0.00% en relación a la semana anterior.

XI. AGRADECIMIENTO.

El presente Boletín Epidemiológico se ha elaborado gracias a la información y esfuerzo conjunto de los responsables de Epidemiología de la Red Cusco VRAEM.



Unidad Ejecutora 406 Red de Servicios de Salud Cusco VRAEM

Jr. Intiraymi – Kimbiri

<https://riscuscovraem.pe/vea/>